

Arzt-Name \_\_\_\_\_

Patienten-Name \_\_\_\_\_

Datum der Bewertung \_\_\_\_\_ Datum des Eingriffs \_\_\_\_\_

Operativer Eingriff \_\_\_\_\_

## Risiko-Faktoren: zutreffende Felder ankreuzen

- Diabetes  ASA≥3  Wund-Klasse II  
(sauber/ kontaminiert)
- Adipositas  OP Dauer >120 Minuten

Wenn der Patient Wundklasse III oder IV oder eine Notfalloperation hat, sollte der Risikostatus des Patienten als hoch eingestuft werden, unabhängig vom Status aller anderen Risikofaktoren.

## Risiko-Ermittlung: ergibt sich aus den angekreuzten Feldern

(1 Kreuz = geringes Risiko, 3 Kreuze = sehr hohes Risiko)

**Sehr Gering**



**Gering**



**Mittel**



**Hoch**



**Modernen  
Wundverband**

**Modernen  
Wundverband**

Ziehen Sie ciNPT in Betracht,  
wenn der Kosten-Nutzen es  
zulässt

**Negative  
pressure  
therapy (ciNPT)**

Produkt Indikation  
**Mepilex® Border Post-Op**

Produkt Indikation  
**Avance® Solo**

## Ergebnis: Risiko-Profil des Patienten

- Sehr Gering  Gering  Mittel  Hoch

Referenzen: [www.molnlycke.com/product-support/post-op-recovery-references/](http://www.molnlycke.com/product-support/post-op-recovery-references/)  
Erfahren Sie mehr über Avance Solo auf [www.Avancesolo.de](http://www.Avancesolo.de)

**Behandlungs-  
empfehlung**

